

var. caespitosa, *Nob.*,—*A. caespitosa*, *Tod., Hort. Pan., tom. I. p. 32. t. VIII.*—Sic *Todarus* (op. cit. p. 32.): foliis carnosis, laete viridibus, elongato-sublanceolatis, supra basin angustatis, in medio vix dilatatis, a medio ad apicem spina terminali debili, tereti, laete castanea munitum, gradatim attenuato-acuminatis, subtus a basi ad medium semiteretibus, a medio fere usque ad apicem gradatim explanatis, ad apicem convexiusculis, supra per totam longitudinem fascia ex albo-viridi notatis, a basi usque ad quartum inferiorem planiusculis, a quarto inferiore usque ad apicem concaviusculis, margine dentibus parvis, vix invicem remotis, spinescentibus, laete castaneis, alterne maioribus, a basi usque ad apicem munito.

A. breviter caulescens, interdum basi ramosa v. caudice furcata, foliis laxè rosulatis, carnosò-coriaceis, pellucide-viridibus, ensiformibus, planis, basi et e medio ad apicem sensim angustatis, mucrone terminali haud v. parum pungente, parvo, castaneo-nigrescente, margine dentato, dentibus minutis, crebris, inaequalibus, deltoideis, patentibus v. apice versis castaneisque; — scapo parvo, vix triplo foliis longiore, crasso, bracteis appressis, multis, inferne triangulari-acutis, pungentibus, deinde lanceolatis, membranaceis induto, floribus in panicula cylindrica, subspicata, cernua, pedunculatis, pedunculis et pedicellis subsoletis, bracteatis bracteolatisque, bractea vix $\frac{1}{2}$, bracteolis linearibus, parvis, acutis, basi dilatatis, tubi perigonio late infundibulari, ovario aequilongo, fauce dilatato, limbi laciniis oblongis, obtusis, erecto-falcatis, patentibus, filamentis tubo insertis, subulatis, vix aut duplo laciniis longioribus, antheris ligulatis, versatilibus, stylo staminibus longiore ac subaequali, stigmate capitato, subdiviso, ovario oblongo-trigono, capsula globosa, obtuse obscureque angulata, elliptico-trigona.