

5. *Y. GUATEMALENSIS*, *Baker in Saund. Ref. Bot.* t. 313; *Engelm. Mon.* 38.—*Y. Roezlii* et *Ghiesbreghtii hort.*—*Dracæna Ehrenbergii*, *Fintelmanni*, *Lennei*, *yuccoides* et *eusifolia hort.* Habitus omnino *Y. aloifolia*. Caulis interdum 15–20-pedalis sæpissime simplex basi tuberosus. Pars foliosa caulis 1–2-pedalis. Folia 50 vel ultra laxè disposita ensiformia 2–3-pedalia medio 2–3 poll., supra basin 10–12 lin. lata nitide viridia lævia, apice vix pungente, margine obscure serrulato albido, superiora ascendente multo recurvata. Pedunculus brevissimus. Panicula densa rhomboidea 2–3-pedalis, ramis centralibus semipedalibus, pedicellis 9–18 lin. longis, bracteis albis scariosis pedicello brevioribus. Perianthium album 2½–3 poll. longum, segmentis oblongo-lanceolatis acutis 9–12 lin. latis, exterioribus latioribus. Ovarium oblongum 7–8 lin. longum, stylo crasso 1 lin. longo, stigmatibus quadratis patulis profunde emarginatis, stylo æquilongis. Stamina ovario distincte breviora, filamentis apice post anthesin patulis. Fructus ignotus. *Mexico et Guatemala*, ab *Ehrenberg* versus annum 1850 in hortos introducta. *Hacienda de la Laguna*,^{*} *Schiede & Deppe* anno 1829! (*Herb. Mus. Brit.*). *Y. MOOREANA*, *hort. Peacock*, a typo recedit floribus multo minoribus, segmentis ovato-lanceolatis 1½ poll. longis.