

schärflich; Blüten groß, etwa 5 cm lang. f. obliqua *Haw. pr. sp.*, Pflanze stammbildend, Blätter grau-grün, reichlich $3\frac{1}{2}$ cm breit. f. rufocincta *Haw. pr. sp.*, fast stammlos; Blätter leicht zurückgekrümmt, schwach-graugrünlich, etwa 5 cm breit und überall glatt, die Ränder rotbraun und ansehnlicher; Kronfelschzettel an der Spitze mehr verschmälert. f. Ellacombei *Bak. pr. sp.*, fast stammlos; Blätter 40—50, ziemlich straff, 60—80 cm lang, in der Mitte 38 bis 44 mm breit, oberseits hohl und lange graugrünlich bleibend, beiderseits glatt; Kronfelschzettel zugespitzt, 6— $7\frac{1}{2}$ cm lang, untere Blütenstielchen 25—38 mm lang. f. acuminata *Sw. pr. sp.*, fast stammlos; Blätter 50—60, bis 60 cm lang, grün, gestreift, zugespitzt, in der Mitte 38—44 mm breit; Blütenstengel doppelt so kurz als die Blätter; Rispe kleiner als bei der Stammform; Blüten weniger zahlreich, $3\frac{1}{2}$ —5 cm lang; bei f. acuminata patens (syn. *Y. patens Andre*) sind die Blätter nur zahlreicher, breiter und mehr graugrünlich. f. tortulata *Bak. pr. sp.*, stammlos; Blätter etwa 40, straff, graugrünlich, 45—55 cm lang, in der Mitte 28—31 mm breit, oft schiefgebogen. f. pruinosa *Bak. pr. sp.*, stammlos, Blätter 70—80, straff, 60—80 cm lang, in der Mitte fast flach, 3— $3\frac{1}{2}$ cm breit, graugrünlich.